

(ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ବର୍ଷାପରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର) ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଛୋଟ ଗଛର ପାଖରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳନ୍ତି ଗଛରେ ଗଛଠାରୁ ୨ ମିଟର ଦୂରତାରେ ୩୦ ସେ.ମି. ଗଭୀର ଏବଂ ୩୦ ସେ.ମି. ଓସାରର ଟ୍ରେସ୍ ଖୋଳି ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

କାଣ୍ଡଛାଣି :

ଛୋଟ ଗଛର ମୂଳଠାରୁ ୭୫-୧୦୦ ସେ.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ପରଠାରୁ ୨୦-୨୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ୪-୫ ଗୋଟି ଶାଖା ବଢ଼ାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗାଣା, ଶୁଖିଲା, ସରୁ ଏବଂ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ତାଳକୁ କାଟିଦେଇ ବୋର୍ଡ଼ାକୁ ପେଷ୍ଟର ଲେପ ଦିଆଯାଏ ।

ଜଳସେଚନ :

ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛକୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ୩-୭ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ଫଳନ୍ତି ଗଛରେ ବର୍ଷାରତ୍ନ ପରଠାରୁ ଫଳଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଫଳ ଧାରଣ ଠାରୁ ପାକଳ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ୨-୩ ଥର ୧୫-୨୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ବୁଢ଼ା ଜଳସେଚନ ସହିତ ଛାଦିକରଣ କଲେ ଅଧିକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । ବୁଢ଼ା ଜଳସେଚନରେ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶତକଡ଼ା ୩୦-୪୦ ଭାଗ କମ୍ ଏବଂ ଅମଳ ପ୍ରାୟ ୨୦-୩୦ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ୧୦ମି. ଫୁ ୧୦.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛରେ ବୁଢ଼ା-ଜଳସେଚନ କଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଟ. ୨୫୦୦୦/- ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯତ୍ନ :

ବଗିଚାର ଚତୁଃ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ବାଡ଼ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆମ ବଗିଚାକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପରେ ଅଗଭୀର ଋଷ କରି ସମସ୍ତ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣନାଶକ ଆଲାଇକ୍ସର (୧୬୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ (୨୪୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) କୁ ଅନାବନା ଗଛ ଉପରେ ପକାଇ ଦମନ କରାଯାଇପାରେ । କଲମୀ ଯୋଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ଖୋଲିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆମ ବଗିଚାରେ ୫-୭ ବର୍ଷଯାଏ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ (ଯଥା : କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି), ପନିପରିବା, ମସଲା, ଫୁଲ, ତାଲି ଓ ତୈଳବାଜ ଫସଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ପୁରୁଣା ବଗିଚାରେ ଅଦା, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସପୁରୀ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ :

ଆମ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ।

୧) କଳା ଫିଫି ରୋଗ : ଏଥିପାଇଁ ଶୋଷକ ପୋକ, ଆମତାହାଣୀ, ତୁନିଆ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ । ଗଛରେ ସ୍କାର୍ (୨୦ ଗ୍ରା./ଲିଟର) ପାଣି ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ । ଗଛରେ ଡ୍ରେଟେବଲ୍ ସଲଫର (୫୦% ଇ.କ୍ସ.) ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍, ମନୋକ୍ସିଡିଫୋସ୍ ୧.୫ ମି.ଲି. ଏବଂ ବବୁଲ୍ ଅଠା (୩ ମି.ଲି.) ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ ।

୨) ଫଳ ପଚାରୋଗ : ଆମ ତୋଳିବାର ୪୫,୩୦ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ଥାଇଓଫୋନେଟ୍ ମିଆଇଲ୍ (୧ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି) କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ (୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି) ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ । ଅମଳ ପରେ ଆମ ଗୁଡ଼ିକୁ ୫୧-୫୩ ଡ୍ରୀଗ୍ ସେଲ୍ସିୟସ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ପାଣି (୦.୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି)ରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଯାଏ ।

୩) ଆମ ତାହାଣୀ : ବଗିଚାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖି ବଉଳ ମୁଣ୍ଡା ହେବା ସମୟରେ ମନୋକ୍ସିଡିଫୋସ୍ ୩୬% ର.ଉ.) (୧.୫ ମି.ଲି./ଲିଟର) ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଉଳ ସମୟରେ (ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ) ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୧ ମି.ଲି./୪ ଲିଟର ପାଣି) ଏବଂ ଟଣା ସମୟରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ର.ଉ. (୨ ମି.ଲି./ଲିଟର) ପାଣି ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ ।

୪) ପତ୍ର ଜାଲପୋକ : ଜାଲକୁ ସଫାକରି ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨-୩ ଥର କାର୍ବାରିଲ୍ ୫୦% ଡ.ଟ. (୪ ଗ୍ରା./ଲିଟର) କିମ୍ବା କ୍ଲୁନାଲଫସ୍ ୨୫% ର.ଉ. (୨ମି.ଲି./ଲିଟର) ବଦଳାଇ ପକାଯାଏ ।

୫) ଫଳମାଛି : ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାକଳ ଫଳ ଝଟି ପଡ଼ି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଆମଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମିଆଇଲ୍ ଯୁଜିନଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରା ଫଳ ପାକଳ ହେବା ସମୟରେ ବସାଯାଏ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ ଓ ୧ ମି.ଲି. ମାଲାଥିଅନ୍ ମିଶାଇ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦ଟି ବିଷଥୋପ ରଖାଯାଏ ।

ଅମଳ :

କିସମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଧାରଣାର ୯୦-୧୨୦ ଦିନରେ ଆମ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ କରି ଫଳ ତୋଳି ଛୁରାରେ କାଟି ଟାକୁଆ ଟାଣ ଏବଂ ରସର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପାକଳ ହେବାର ଜଣାଯାଏ । ଆମ ଗଛ ୩-୪ ବର୍ଷରୁ (୧୫-୨୦ଟି) ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪୦ ବର୍ଷଯାଏ (୨୫୦୦ ଗୋଟି) ବଢ଼ି ପରେ କମିଯାଏ । ୧୫-୨୦ ବର୍ଷର ବଗିଚାରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୪-୫ ଟନ୍ ଆମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଦେଶୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁନାରୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମ ପଚାଯାଏ । ମାତ୍ର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଇଥ୍ରେଲ ଦ୍ରବଣ (୧.୮ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି) ରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଫଳର ରଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହେବା ସହିତ ଆମଗୁଡ଼ିକ ସମଭାବରେ ପାଟିଯାଏ ।

ଚାଷ ଜନିତ ଆୟ :

(ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ)

୧ମ ବର୍ଷ	୨ ବର୍ଷ	୩ୟ ବର୍ଷ	୪ର୍ଥ ବର୍ଷ	୫ମ ବର୍ଷ	୬ଷ୍ଠ ବର୍ଷ	୭ମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ (ବର୍ଷିକ)
୧୧୦୦୦	୭୦୦୦	୭୫୦୦	୬୦୦୦	୭୦୦୦	୮୦୦୦	୮୫୦୦

ଚାଷ ଜନିତ ଆୟ :

ଆମ ଗଛରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷଠାରୁ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ବଢ଼ିଚାଲେ । ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁମାନିକ ଅମଳ ଓ ଆୟ ନିମ୍ନମତେ ହୋଇପାରେ ।

ଏକ ଏକର ଆମ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ଷ	୬ମ ବର୍ଷ	୭ମ ବର୍ଷ	୮ମ ବର୍ଷ	୯ମ ବର୍ଷ	୧୦ମ ବର୍ଷ	୧୧ବର୍ଷ	୧୨ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ (ବାର୍ଷିକ)
ଏକର ପ୍ରତି	୮୦୦	୨୦୦୦	୩୦୦୦	୪୦୦୦	୪୫୦୦	୫୦୦୦	୫୦୦୦(କି.ଗ୍ରା.) ଫଳ
ବିକ୍ରିଦର	୮୦୦୦	୨୦୦୦୦	୩୦୦୦୦	୪୦୦୦୦	୪୫୦୦୦	୫୦୦୦୦	୫୦୦୦୦(ଟ. ୧୦ କି.ଗ୍ରା.)

ସହାୟତା :

ସହାୟତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନେସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ବୋର୍ଡ଼, ନାବାର୍ଡ଼ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବିତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

ସହାୟତା :

କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନବିତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନେସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲ୍ଚର ବୋର୍ଡ଼, ନାବାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । କେତୋଟି ଉପଯୋଗୀ ଠିକଣା ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।



ଉନ୍ନତ ଆମ ଋଷ



ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଉନ୍ନୟନ ସମିତି

ଉଦ୍ୟାନ ଭବନ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୫

ଫୋନ୍ : ୦୬୭୪-୨୫୫୧୮୩୧, ଫ୍ୟାକ୍ସ : ୦୬୭୪-୨୫୫୧୯୭୮

website:www.orihort.in
email:udyanhort@sify.com



ଆମ ଋଷ

ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ରସାଳ ଓ ସାଦମୁକ୍ତ ଫଳ । ଆମ ଦେଶରେ ଆମକୁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଆମଚାଷ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆମଚାଷ କରାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟବହାର :

କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ କଞ୍ଚା ସମୟରେ ତରକାରୀ, ଆଚାର, ଚଟଣୀ, ଆମଚୁର, କ୍ଲାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପାଚିଲା ଆମରୁ ଆମସଜା, କ୍ଲାସ, ଜାମ୍, ନେକ୍କାର, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କଞ୍ଚା ଆମରେ ଭିଟାମିନ୍ ‘ସି’ ଓ ପାଚିଲା ଆମରେ ଭିଟାମିନ୍ ‘ଏ’ ଅଧିକ ଥାଏ । କୋଇଲିରୁ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାବୁନ କରାଯାଏ ।

କିସମ :

ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କିସମର ଆମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଋଷ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀକ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଙ୍ଗ୍ରା, ଚୌସା, ତୋଟାପୁରୀ, ସବୁର୍ଷ୍ଟରେଖା, ବମେଗ୍ରାନ, ଗୋଲାପଖାସ୍, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ଆମପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ହିମ୍‌ସାଗର, ଚେରୁକରସମ, ଦଶେରୀ, ନିଲମ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି । ଗୋଟିଏ ଆମ ବଗିଚାରେ ଏକାଧିକ କିସମ ଚାଷ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ବଂଶବିଷ୍ଣୁ :

ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ନର୍ସରୀରୁ ୮-୧୨ ମାସର ନିରୋଗୀ, ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଏବଂ ସିଧା ବଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କିସମର କଲମା ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ଲଗାଇବା ସମୟ : ଜୁନ୍-ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମଗଛ ଲଗାଯାଏ । ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଋତୁ ପରେ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ ।

ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଚାରା ଲଗାଇବାର ୨ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୧ ମିଟର ଗଭୀର, ୧ ମିଟର ଓସାର ଏବଂ ୧ ମିଟର ଲମ୍ବର ଗାତ ଖୋଳି ଉପର ଓ ତଳ ମାଟିକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ । ୧୫-୨୦ ଦିନ ଖରା ଖାଇବା ପରେ ଶୁଖିଲା କୁଟା କାଠିଦ୍ୱାରା ପୋତି ଦିଆଯାଏ । ଉପର ମାଟି ସହିତ ୫ ଝୁଡ଼ି ସଜ୍ଜା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ୨ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ବା/କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ହାତଗୁଣ୍ଡ ସାର ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ (୧.୫%) ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଭୂମି ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚକରି ଗାତ ପୂରଣ କରାଯାଏ ।

ଋତା ରୋପଣ :

ଦୁଇ ତିନି ଅସରା ବର୍ଷାପରେ ଚାରା ଲଗାଯାଏ । ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଚାରାକୁ ୨-୩ ଦିନ ଛାଇରେ ରଖାଯାଏ । ପଲିଥିନ୍‌କୁ ବାହାର କରି (ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ନ ଭାଙ୍ଗି) ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଆକାରର ଗାତଟିଏ କରି ଚାରାଟିକୁ ସିଧାକରି ଲଗାଯାଏ, ଯେପରିକି ଯୋଡ଼ ଅଂଶଟି ମାଟି ପତ୍ତନଠାରୁ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ । ଗଛମୂଳରେ ମାଟି ଭଲଭାବରେ ଦାବି ଦେଇ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ।



ଜଳବାୟୁ :

ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆମଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୬୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୨୪-୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଋଷ କରାଯାଇପାରେ । ବଉଳ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ର (୮୦% ରୁ ଅଧିକ), କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଲେ ଆମଗଛରେ ରୋଗପୋକ ବଢ଼ିଯାଇ ବଉଳ ଝୁଟିଯାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା :

ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଆମଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର (୨ ମିଟରରୁ ଅଧିକ), ଉର୍ବର, ଦୋରସା, ନିଗିଡ଼ା ଏବଂ ଅମ୍ଳତା (ପି.ଏଚ୍). ୫.୫-୭.୫ ଥିବା ମାଟିରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରେ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଜମିକୁ ୨-୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଅନାବନା ଗଛ ବାଛି ଦିଆଯାଏ ।

ଲଗାଇବା ଦୂରତ୍ୱ :

ଆମ ଗଛକୁ ୯-୧୦ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ (ଏକର ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ଟି ଗଛ) ଲଗାଯାଏ । ମଧ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ବଗିଚାରେ ୫ ଘ ୫ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬୦ଟି ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ :

ପାହାଡ଼ିଆ, ଢାଲୁ ତଥା ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟୁର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ଗାକାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମଗଛ ଲଗାଯାଏ ।

ଖତସାର :

ଆମଗଛରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ୟସ ଅନୁପାତରେ ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକିଆ ଗଛପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି (୧୦ କି.ଗ୍ରା) ସଜ୍ଜା ଗୋବର ଖତ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ୬୩ ଗ୍ରାମ୍ (ୟୁରିଆ ୧୫୮ ଗ୍ରାମ୍), ଫସଫରସ୍ ୧୮ ଗ୍ରାମ୍ (୧୧୨ ଗ୍ରାମ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍) ଏବଂ ପୋଟାସ୍ ୬୮ ଗ୍ରାମ୍ (ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ୧୧୩ ଗ୍ରାମ୍) ଦେବା ଦରକାର । ଏ ମାତ୍ରାର ଖତ ଓ ସାର ଆମ ଗଛ ୧୦ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢେଇ ବଢେଇ ଦିଆଯାଏ । ଯେପରିକି ୧୦ ବର୍ଷକିଆ ଆମଗଛକୁ ୧୦ ଝୁଡ଼ି ଗୋବର ଖତ ସହିତ ୧୫୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ୧୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ୧୧୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜଳସେଚନର ସୁବିଧାଥିଲେ ୧ ରୁ ୩ ବର୍ଷର ଗଛକୁ ୩-୪ ଥରରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଫଳନ୍ତି ଗଛରେ ସମସ୍ତ ଖତ ଓ ସାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଏକ ଭାଗ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ