

୧) ଝାଉଁଳା ରୋଗ : ଏଥିରେ ଗଛ ମଳା ମଳା ହୋଇ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ପ୍ରାୟ ୩୦-୭୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଏ । ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ନାରୋଗା ବିହୀନ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଯାଏ । ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ମାଟିରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ପାଉଁଶ (୧୨ କି.ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର) ମିଶାନ୍ତୁ । ଆଳୁଟାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ।

୨) ମୂଳକଟା ପୋକ : ମାଟିଆରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଶୁକ୍ଳଗୁଡ଼ିକ ଦିନବେଳା ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସଂଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରି ମୂଳକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ଝାଉଁଳିଲା ପରି ଜଣାପଡେ ।

ପରିଚାଳନା : ଗଛ ମୂଳ ମାଟିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ (୨ ମି.ଲି/ଲିଟର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତେଷ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

୮) ଧବଳ ଭୁଞ୍ଜ ପୋକ : ଧଳାରଙ୍ଗର ଶୁକ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ରହି ଆଳୁକୁ କଣା କରନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା : ଜମିକୁ ଚାଷ କରି ପୋକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମରାଯାଏ । ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକକୁ ଧରି କିରୋସିନ୍ ପାଣିରେ ପକାଯାଇ ମରାଯାଏ । ଫସଲରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ସିଂଚନ କରାଯାଏ ।

୯) ଡାଉରପୋକ : ହାଲୁକା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସରୁ ସରୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଳୁରେ କଣା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଆଳୁ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆଳୁମଣ କରିଥାନ୍ତି । ଅମଳ ପରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା : ଜମିରେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଡାଲିକାତାୟ ଫସଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଫୋରେଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

୧୦) ଉଇ : ଏମାନେ ଆଳୁଗଛର ଚେର ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଗଛ ଝାଉଁଳିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ମାଟିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ (୧୨ କି.ଗ୍ରା./ଏକର) କିମ୍ବା ଫୋରେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଫମ୍ପା ଆଳୁ : ସମୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆକାରର ଆଳୁର ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା କମ୍ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । କୁପ୍ରି କ୍ୟୋଟି ଏବଂ କୁପ୍ରି ସୁନ୍ଦରା କିସମରେ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କିସମ ଲଗାଯାଏ ।

କଳାଦାଗ : ଆଳୁକୁ ୩୫-୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତାପରେ ରଖିଲେ ଆଳୁ ଭିତରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥି ପାଇଁ ଆଳୁକୁ କମ୍ ଉତାପରେ ରଖାଯାଏ ।

ଅମଳ : କିସମ ଅନୁସାରେ ବିହନ ଲଗାଇବାର ୮୦-୧୨୦ ଦିନରେ ଆଳୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଖୋଳିବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ । ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଳୁ ଖୋଳାଯାଏ । ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଆଳୁକୁ କ୍ଷତ ନ ପହଂଚିବା ଦରକାର । ଅମଳ ପରେ ୧୦-୧୨ ଦିନ ଛାଇରେ ରଖି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ ସବୁ ବାଛି ଦେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅମଳ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦର କମ୍ ଥାଏ । ତେଣୁ ଶୀତଳ ଋତୁର କିମ୍ବା ପବନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗୃହରେ ରଖି ପରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏକର ପ୍ରତି ୮୦-୧୦୦ କି୍ୱାଲ ଆଳୁ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (୨୦୧୪-୧୫)

ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷ ଓ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଏକର ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ

- » ଚଳ ଭିତିକ ଆଳୁଚାଷ (୫୦ ଏକର) କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- » ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଖତ ସାର କିଣି ନିଜତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲ୍ ପଲ୍ଲୀ କରିବାକୁ ହେବ ।
- » ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆଳୁ ଚାଷର ଫଟୋ GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ପ୍ରବଚ୍ଚ ବିଲର ୫୦% ବା ସର୍ବାଧିକ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିର୍ଷିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
- » MARKFED ଏବଂ NAFED ମାଧ୍ୟମରେ ୪ ଲକ୍ଷ କି୍ୱାଲ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
- » ଗଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- » ଆଳୁ ବିହନ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକୃତ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

@uk Pun



IWgû C\ýû^ Kh ^ùÿgûkd Gaö
IWgû C\ýû^Kh C^d^ i cZ
C\ýû^ ba^, ^dû_ fû, baù^ge -751015
ù`î^ - 0674-2551831, `ÿK-0674-2551978
Website: www.odihort.nic.in
email: supportdho.od@nic.in

ଆଳୁ ଚାଷ

ଆଳୁ ଆମ ଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୭ ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଣାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ୫ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି । ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଳୁ ସମସ୍ତ ଚରକାରୀରେ ପତିପାରେ ଏବଂ ଆଳୁରୁ ଚିପସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସାଧନ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉତ୍ପାଦନ

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମର ବାର୍ଷିକ ଆଳୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ୧୦.୨୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଉତ୍ପାଦିତା ହାର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧.୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜ୍ଞେତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବି ହେବାକୁ ହେଲେ ଜମିର ପରିମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ।

ଜଳବାୟୁ : ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଚଳରେ ଶୀତଋତୁରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୧୫-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉଚ୍ଚତା ଦରକାର । ମାତ୍ର ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଆଳୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ । ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିଲେ ଆଳୁ ଭଲ ଫଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ୨୯ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆଳୁ ପ୍ରାୟ ଫଳେ ନାହିଁ ।

ମୃତ୍ତିକା : ଆଳୁଚାଷ ପାଇଁ ହାଲୁକା, ନିଗିତା, ଉର୍ବର, ଦୋରସାରୁ ବାଲି ଦୋରସା ଏବଂ ୫.୫-୭.୫ ଅମ୍ଳତା ଥିବା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ।

କିଷମ : ଆଳୁର ଅନେକ ଗୁଣିତ ଉନ୍ନତ ଓ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିଷମ ରହିଛି । ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୁପ୍ରି ଜ୍ୟୋତି, କୁପ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁପ୍ରି ଲାଲିମା, କୁପ୍ରି ସିନ୍ଦୂରୀ, କୁପ୍ରି ବାଦଶାହୀ ଓ କୁପ୍ରି ପୋଖରାଳ କିଷମ ଉପଯୋଗୀ ।

ବିହନ : ଆଳୁକୁ ଗୋଟା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆଳୁକୁ କାଟି ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଆଳୁର ଆକାର ଓ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ବିହନ ପରିମାଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ମଞ୍ଜି ଆଳୁର ଆକାର (ମି.ମି.)	ମଞ୍ଜି ଆଳୁର ଓଜନ (ମି.ମି.)	ଲଗାଇବା ଦୂରତା (ସେ.ମି.)		ବିହନ ପରିମାଣ (କି.ଗ୍ରାମ / ଏକର)
		ଧାତିକୁ ଧାତି	ଗଛକୁ ଗଛ	
୨୫-୩୫	୧୫-୨୫	୪୫-୬୦	୧୫-୨୨	୮-୧୦
୩୫-୪୫	୨୫-୩୫	୬୦	୨୦	୧୦-୧୨
୪୫-୫୫	୩୫-୪୫	୬୦	୨୫	୧୨-୧୪

ଆଳୁ ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଛୋଟ (୧୦-୧୫ ଗ୍ରାମ) ହେଲେ ଧାତିକୁ ଧାତି ବ୍ୟବଧାନ ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଦିଆଯାଏ । ଶାସ୍ତ୍ର ଗଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଚଟାଣରେ ଡାଳିଦେଇ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ୧୨-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ସରୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା ଗଜାକୁ ବାଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଆଳୁର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୩ ଗୋଟି ଆଖି ରଖି କାଟି ମାଙ୍କୋଜେବ (ଡିଥେନ-ଏମ-୪୫ - ୩ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ପାଣି) କିମ୍ବା ଏମିସାନ୍ (୩ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି) ଦ୍ରବଣରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ରଖାଯାଏ । ଗୋଟା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ । ୨୦ ଲିଟର ଦ୍ରବଣରେ ଏକ କ୍ୟୁଷାଳ ଆଳୁକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ଉଭୟ ପ୍ରାମାଣିତ କିମ୍ବା ପେଣି ପୋଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଜି-୩ କିମ୍ବା ଜି-୪) ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଆଳୁ ଲଗାଇବା : ଶୀତ ଋତୁରେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ ବିହନ ଲଗାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ୧ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ୪-୫ ଓଡ଼ ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ କରି ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୬-୮ ଟନ ସତ୍ତା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କ୍ୟୁରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଠ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ହୁଡ଼ା କରାଯାଏ । ହୁଡ଼ାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ୬-୭ ସେ.ମି. ଗଭୀରର ସିଆର କରି ମୂଳସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ସାର ଉପରେ ୧-୨ ସେ.ମି. ବହଳର ଖତ ଓ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଆଳୁ ଲଗାଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଯାଏ । ସିଆରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଶିମ ରହିଲେ ଭଲ । ଗଛ ଉଦ୍ଭାବନା ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଦିଆଯାଏ ।

ସାର ପ୍ରୟୋଗ : ଆଳୁ ଫସଲରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫-୩୫ ଟନ୍ ଅମଳ ଦେଉଥିବା ଫସଲରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୦-୧୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ୪୫ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଏକର ପ୍ରତି ସାର (କି.ଗ୍ରା.ରେ) ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ସାର ଉପାଦାନ	ଲଗାଇବା ସମୟରେ	୨୦-୨୫ ଦିନ	୪୦-୪୫ ଦିନ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ	୨୫	୧୨	୧୨
ଫସଫେଟ୍	୨୫	-	-
ପୋଟାସିୟମ୍	୪୮	-	-

ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫା ସାର ଧାତିର ଦୁଇପାଖରେ ୨-୩ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ୪-୫ ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା. ନିଶ୍ଚିତ ଅଣୁସାର ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅମଳ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ : ସାର ଦେବା ସମୟରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ସମସ୍ତ ଅନାବନା ଗଛ ନଷ୍ଟ କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଆଯାଏ । ଆଳୁ ପକାକୁ ଦେଖାଗଲେ ନାଳ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ବଜାର ଦର ଜମିଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ

ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଜଳସେଚନ ସମୟରେ ହୁଡ଼ାର ଦୁଇ ଦୃତୀୟାଂଶ ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର । ଆଳୁ ଜମିରେ ଜଳାଭାବ ରହିଲେ ଅମଳ ଜମିଯାଏ । ଜଳସେଚନ / ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଖସି ଗଲେ ମାଟି ଟେକିବା ଉଚିତ୍ ।

ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା

୧) ସହଜ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟୁଆ ବା ଗୋଲାକାର ଚିହ୍ନ ଶିରା ମଝିଆଁରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ନାରୋଗ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଯାଏ । ଗଛରେ ମାଙ୍କୋଜେବ (ଡିଥେନ-ଏମ-୪୫-୪ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ପାଣି) ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁରିଆ (୧୦ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ପାଣି) ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ସହନଶୀଳ କିଷମ (କୁପ୍ରି ଜ୍ୟୋତି) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୨) ବିଳମ୍ବ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ପତ୍ର, ଡେମ୍ଫ, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଳୁରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ । ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଇ ଅମଳ ଜମିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ନାରୋଗ ଏବଂ ସହନଶୀଳ କିଷମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଫସଲରେ ମେଟାଲକାସିଲ + ମାଙ୍କୋଜେବ (୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଲିଟର) ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ଆଳୁକୁ ସହଜ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।

୩) ଯାଦୁରା ରୋଗ : ଆଳୁରେ ଖଦଖଦତିଆ, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ନାରୋଗ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଯାଏ । ଆଳୁର ଜମିରେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବିହନକୁ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ (୩୦ ଗ୍ରାମ୍ / ଲିଟର) ଦ୍ରବଣରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ସହନଶୀଳ କିଷମ (କୁପ୍ରି ସୁନ୍ଦରୀ, କୁପ୍ରି ଲାଲିମା, କୁପ୍ରି ଅଳଙ୍କାର) ଲଗାଯାଏ । ଫସଲରେ ସି.ଏ.ଏନ. ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

୪) ମୋକାଇକ୍ ରୋଗ : ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛବିକା ହୋଇ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ବଗିଚାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ । ଗୁଡ଼ାକୁ ପରିବହନ କାଳୀ (କରପୋକ) ନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଚାଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ନିରୋଗ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମିଆଇଲ୍ ଡିମେଟନ୍ କିମ୍ବା ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ (୨ ମିଲି / ଲିଟର ପାଣି) ସିଂଚନ କରାଯାଏ ।

୫) ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ : ଏଥିରେ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ସହଜ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପରି କରାଯାଏ । ଆଳୁ ଫସଲ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସେହି ଜାତୀୟ ଫସଲ (ଯଥା- ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ) କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଆଳୁର ଆଳୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ।